

	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>Código: I-SP-VC36-01</b>
	<b>INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHA EPIDEMIOLÓGICA EXPOSICION A FLUOR</b>	<b>Fecha Aprobación: 14/02/12</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

## DATOS BASICOS

A. Nombre y Apellidos del Pacientes: Nombre completo como se diligencio en

Datos básicos.

B. Tipo de Identificación: Escribir el que corresponda

- 1.RC: Registro civil
- 2.TI: Tarjeta de Identidad
3. CC: Cedula de ciudadanía
4. CE: Cedula de extranjería
5. PA: Pasaporte
- 6.MS: Menor sin identificación
- 7.AS: Adulto sin identificación

C. Número de Identificación: escribir el número completo igual al de datos Básicos

## 5. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

5.1 Estrato socioeconómico

1 2 3 4 5 6

5.2 Escolaridad

1. Primaria
2. secundaria
3. superior
4. Ninguna
5. Preescolar

## 6. INFORMACIÓN CLÍNICA

6.1 Índice de Dean: marcar el número correspondiente a la condición clínica de la lesión.

Convenciones

- 0 Normal
- 1 Dudoso
- 2 Muy leve
- 3 Leve
- 4 Moderada
- 5 Severa
- 9 No aplica

6.2 Clasificación clínica de las lesiones (Índice de DEAN) y clasificación del paciente

1. Dudoso
2. Muy leve
3. Leve
4. Moderada
5. Severa

 <p>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER</p>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>Código: I-SP-VC36-01</b>
	<b>INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHA EPIDEMIOLOGICA EXPOSICION A FLUOR</b>	<b>Fecha Aprobación: 14/02/12</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 2 de 3</b>

### 6.3 Presencia de caries

1. SI
2. NO

### 6.4 Tipo de caries

1. No cavitacional
2. Cavitacional

## 7. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES

7.1 Durante el segundo y tercer trimestre de embarazo de la madre, el sitio de residencia fue: (Sólo para pacientes de 6 años y gestantes)

1. Zona urbana
2. Zona rural

7.2 Los primeros 9 años de vida, el sitio de residencia del paciente fue:

1. Urbana
2. Rural
4. Otro pais

7.3 Fuente de consumo de agua (Sólo para pacientes de 6 años y gestantes)

1. Acueducto
2. Pozo subterráneo/Aljibe
3. Quebrada
4. Agua embotellada
5. Otro

7.4 Fuente de consumo de sal (Sólo para pacientes de 6 años y gestantes)

1. Sal comercial
2. Sal de ganado
3. Otro

7.5 Tipo de sal (Sólo pacientes de 6 años y gestantes)

1. Sal comercial Nacional
2. Sal comercial extranjera

7.6 Cuando el paciente fue menor de 8 años, el responsable del cepillado fue, o es:

1. La madre o el cuidador
2. El niño

7.7 Frecuencia de cepillado con crema dental

1. una vez al día
2. dos veces al día
3. tres veces al día
4. cuatro veces al día

 <p><b>INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD</b> NORTE DE SANTANDER</p>	<b>SALUD PUBLICA</b>	<b>Código: I-SP-VC36-01</b>
	<b>INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FICHA EPIDEMIOLÓGICA EXPOSICION A FLUOR</b>	<b>Fecha Aprobación: 14/02/12</b>
		<b>Versión: 01</b>
		<b>Página 3 de 3</b>

5. ninguna

7.8 La cantidad de crema dental según el tamaño de la cabeza del cepillo dental es de:

1. un tercio
2. dos tercios
3. tres tercios

7.9 Ingesta de crema dental durante el cepillado

1. si
2. No

7.10 Ingesta de enjuague bucal

1. si
2. No

7.11 Aplicaciones tópicas de flúor en el último año

1. si
2. No

7.12 El paciente tuvo lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad (sólo para pacientes que acuden a consulta con su madre)

1. si
2. No
3. Desconocido

**COPIA CONTROLADA**